



Informativni letak

PREVENCIJA RAKA ŽELUCA

ŠTO JE RAK ŽELUCA?

Rak želuca je zločudna bolest želuca. Želudac je organ u obliku slova J koji se nalazi u gornjem dijelu trbuha. Želudac proizvodi enzime (tvari koje potiču kemijske reakcije) i kiseline (probavne sokove). Mješavina enzima i probavnih sokova omogućuje probavu hrane.

Ukoliko se stanice koje oblažu sluznicu želuca počnu ponašati abnormalno, može doći do njihove nekontrolirane diobe i zločudne preobrazbe. Ukoliko dođe do poremećaja funkcije stanica želuca posljedično se remeti i funkcija želuca kao organa što može biti asimptomatsko ili dovesti do neugodnih simptoma. Prečesto se simptomi od strane gornjeg dijela probavnog sustava zanemaruju. To je i jedan od razloga zašto se rak želuca uglavnom dijagnosticira tek kad je već u uznapredovaloj fazi.

Rak želuca potječe iz stanica koje oblažu sluznicu želuca. Rak je posljednji orak u niz promjena koje se događaju želučanim stanicama, najčešće uslijed *Helicobacter pylori* infekcije¹ (molimo Vas da nastavite čitati kako bi saznali više o *H. pylori*). Prije nego dode do razvoja raka u želucu je moguće uočiti takozvane prekancerozne lezije². Prekancerozne su lezije građene od promijenjenih želučanih stanica te su pod rizikom da se u njima razvije rak. Redovito kliničko praćenje navedenih lezija i pravodobno liječenje ključni su u prevenciji razvoja raka želuca.



KOLIKO JE ČEST ŽELUČANI KARCINOM?

Rak želuca četvrta je najčešća vrsta raka u svijetu. Godišnje se u Europi dijagnosticira oko 136 000 novih slučajeva raka želuca, a oko 97 000 osoba godišnje umre od ove agresivne bolesti³.

Kada se nekome dijagnosticira rak želuca rade se dodatne pretrage i testiranja kako bi se utvrdila proširenost te samim time stadij bolesti. Na temelju informacije o stadiju bolesti određuje se plan liječenja bolesnika. Što je raniji stadij bolesti kod dijagnoze to je veća uspješnost liječenja i veća je vjerojatnost preživljivanja. Upravo je zato ključno bolest dijagnosticirati u najranijem mogućem stadiju.



Reference:

1. Schistosomes, liver flukes and *Helicobacter pylori*. IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Lyon, 7-14 June 1994. IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum **61**, 1 (1994).
2. Rugge, M., Capelle, L. G., Cappellosso, R., Nitti, D. & Kuipers, E. J. Precancerous lesions in the stomach: From biology to Clinical Patient Management. Best Practice & Research Clinical Gastroenterology **27**, 205–223 (2013).
3. Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.fr/today>, accessed 10/07/2022.

TKO JE POD RIZIKOM ZA RAZVOJ RAKA ŽELUCA?

Faktori rizika za koje se zna da povećavaju rizik razvoja raka želuca su⁴:



INFEKCIJA S BAKTERIJOM

HELICOBACTER PYLORI (H. PYLORI): Česta bakterijska infekcija koja povećava rizik razvoja raka želuca ukoliko se ne liječi¹.



SPOL: Muškarci dvostruko češće obolijevaju od raka želuca⁵.



DOB: Osobe starije od 50 godina pod značajno su većim rizikom od razvoja raka želuca u usporedbi sa mlađima od 50. Rak želuca najčešće se dijagnosticira između 60. i 80. godine života⁵.



PUŠENJE: Pušači su pod dvostruko većim rizikom razvoja raka želuca u odnosu na nepušače^{5,6}.



TJELESNA TEŽINA: Prekomerna težina ili pretilost povezani su sa povećanim rizikom od razvoja raka želuca⁵.



DIJETA: Povećan rizik od razvoja raka želuca imaju osobe koje prekomerno konzumiraju usoljeno crveno meso, dimljenu i konzerviranu hranu⁶.



IZLOŽENOST INDUSTRIJSKIM KEMIJSKIM TVARIMA: Pojedinci svakodnevno izloženi prašnjačoj atmosferi i visokim temperaturama okoliša imaju povećani rizik za razvoj više tipova raka, uključujući rak želuca⁵.



OBITELJSKA ANAMNEZA RAKA ŽELUCA: Osobe kojima članovi obitelji boluju od raka želuca imaju veću vjerojatnost da i sami razviju bolest⁵.

ŠTO MOGU UČINITI KAKO BIH SMANJIO/LA RIZIK OD RAZVOJA RAKA ŽELUCA?

Brojni prethodno navedeni faktori rizika povezani su s načinom života. Određenim promjenama načina života možete smanjiti vlastiti rizik za razvoj raka želuca.



TESTIRAJTE SE NA

H. PYLORI:

H. pylori je česta bakterijska infekcija želuca.

H. pylori infekcija najznačajniji je faktor rizika za razvoj raka želuca¹. Testiranje na H. pylori infekciju te liječenje infekcije u slučaju pozitivnog testa može značajno smanjiti Vaš rizik od razvoja raka želuca.



PRESTANITE PUŠITI:

Pušenje značajno povećava rizik od razvoja raka želuca i brojnih drugih bolesti.

Dim cigarete sadrži više od **7000 toksičnih kemijskih spojeva** od kojih je barem 70 dokazano kancerogenih⁷. Pušenjem izlaže svoje tijelo tvarima za koje se zna kako imaju razarajući učinak na Vaš probavni sustav, kao i na druge dijelove tijela.



SMANJITE UNOS SOLI:

Zaštite sluznicu želuca smanjenjem unosom slane i dimljene hrane.

Možete konzultirati Vašeg lječnika za više informacija o tome kako smanjiti rizik razvoja raka želuca promjenama stila života.



Reference:

1. Schistosomes, liver flukes and Helicobacter pylori. IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Lyon, 7-14 June 1994. *IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum* **61**, 1 (1994).

2. Stomach Cancer: Risk Factors | CancerNet. <https://www.cancer.net/cancer-types/stomach-cancer/risk-factors>.

5. Zali, H., Rezaei-Tavirani, M. & Azodi, M. Gastric cancer: prevention, risk factors and treatment. *Gastroenterol Hepatol Bed Bench* **4**, 175 (2011).

6. Rawla, P. & Barsouk, A. Epidemiology of gastric cancer: global trends, risk factors and prevention. *Prz Gastroenterol* **14**, 26 (2019).

7. Harmful Chemicals in Tobacco Products | American Cancer Society. <https://www.cancer.org/cancer/risk-prevention/tobacco/carcinogens-found-in-tobacco-products.html>

KOJI SU SIMPTOMI RAKA ŽELUCA?

Rak želuca obično se razvija tijekom nekoliko godina. Simptomi su u ranoj fazi bolesti često blagi, gotovo neprimjetni te ih je lako moguće interpretirati kao opće, nespecifične probavne tegobe. Upravo zbog važnosti dijagnoze bolesti u ranjoj fazi važno je konzultirati liječnika u slučaju duljeg trajanja simptoma koji nalikuju dolje navedenima.

Simptomi koji mogu upućivati na rak želuca su sljedeći:



poremećaj probave hrane,
npr. često podriđivanje



mučnina i povraćanje, osobito
povraćanje krute hrane brzo
nakon jela



perzistentna bol
u trbušu



nadutost
nakon jela

Simptomi uznapredovalog raka želuca:



krv u stolici ili
crna stolica



gubitak apetita ili
osjećaj sitosti nakon
unosa male količine
hrane



značajan gubitak na
tjelesnoj težini bez
dijete – značajnim
se smatra gubitak od
barem 10% tjelesne
težine

ZAŠTO BIH JA TREBAO SUDJELOVATI U PROGRAMU PREVENCIJE RAKA ŽELUCA?

Veća je vjerojatnost da će liječenje raka želuca biti uspješno
ukoliko se bolest otkrije u ranoj fazi.

Najprije, rak želuca uglavnom se dijagnosticira u kasnoj fazi bolesti kada su simptomi bolesti već prisutni i kada je vjerojatnost uspješnog liječenja značajno manja. Upravo Vam zato sudjelovanje u programima ranog otkrivanja raka želuca, čak i ako nemate nikakvih simptoma može spasiti život.

Unatoč tome, u većini zemalja još uvijek nema organiziranih programa ranog otkrivanja raka želuca. Stoga je važno povećati svjesnost pojedinaca pod rizikom od razvoja raka želuca o prepoznavanju ranih simptoma raka želuca kako bi se povećala vjerojatnost dijagnoze bolesti u ranoj fazi. Svi kojima su članovi obitelji bolovali od raka želuca ili imaju druge faktore rizika trebali bi se javiti nadležnom liječniku kako bi mogli biti upućeni na daljnju obradu.



KAKO SE DIJAGNOSTICIRA RAK ŽELUCA?

Postoji više metoda koje se koriste u dijagnostici raka želuca. Budući da nema standarizirane metode ili programa ranog otkrivanja raka želuca, liječnik načelno odabire metodu ovisno o pacijentovoj osobnoj anamnezi, simptomima te ostalim faktorima.

Najčešće korištene metode dijagnoze raka želuca su:



EZOFAGOGASTRODUODENOSKOPIJA
(SA ILI BEZ UZIMANJA BIOPSIIA)



PEPSINOGENSKI TEST ZA ATROFIČNI
GASTRITIS



SLIKOVNE
METODE



UREA IZDISAJNI TEST ZA H. PYLORI

ŠTO JE TOGAS PROJEKT?



TOGAS je kratica sljedećeg naziva: TOwards GAstric cancer Screening implementation in the European Union, na hrvatskom: Prema implementaciji programa ranog otkrivanja raka želuca u Europskoj uniji. Trenutno u Europi nema učinkovitog široko dostupnog programa ranog otkrivanja raka želuca. Opći je cilj TOGAS projekta pružiti novo znanje temeljeno na dokazima koje će služiti kao temelj za dizajniranje, planiranje i implementaciju odgovarajućih programa ranog otkrivanja i prevencije raka želuca u Europskoj uniji.

Za više informacija o TOGAS projektu molimo Vas da posjetite internet stranicu projekta: <https://www.togas.lu.lv/>

TOGAS projekt uključuje 3 pilot studije (pilot studija naziv je za onu početnu studiju stvorenu s ciljem omogućavanja informiranja, pripreme i dizajniranja konačne sveobuhvatne studije) koje će se provesti duž Europe.

Vi ste pozvani da sudjelujete u pilot studiji 1.

Reference:

8. Tests for Stomach Cancer | Diagnosis of Stomach Cancer | American Cancer Society. (n.d.). Retrieved July 20, 2023, from <https://www.cancer.org/cancer/types/stomach-cancer/detection-diagnosis-staging/how-diagnosed>



Sufinancira
Europska unija

**Ovaj je projekt primio sredstva Europske unije u sklopu programa EU4 Health,
Grant Agreement broj 101101252.**

Financirano od strane Europske unije. Stavovi i mišljenja izneseni ovdje pripadaju isključivo autorima te ne predstavljanju nužno stavove i mišljenja Europske unije ili Europske izvršne agencije za zdravlje i digitalno gospodarstvo (eng. European Health and Digital Executive Agency, HaDEA). Sukladno tome niti Europska unija niti izvršna agencija ne mogu biti odgovorni sa izneseni sadržaj.

Ovaj dokument i njegov sadržaj mogu se reproducirati, spominjati i prevoditi besplatno uz uvjet da se navede izvor.

Za daljnje informacije kontaktirajte Digestive Cancers Europe,
info@digestivecancers.eu